

## Piano Vaccinale nel gatto

Le vaccinazioni obbligatorie sono tre, conosciute con il nome di "trivalente" e comprendono:

- **RINOTRACHEITE INFETTIVA (herpesvirus)**
- **CALICIVIROSI (calicivirus)**
- **PANLEUCOPENIA (parvovirus felino)**

Le vaccinazioni accessorie disponibili riguardano:

- **CLAMIDIOSI**
- **LEUCEMIA FELINA**
- **RABBIA:** obbligatoria per i viaggi all'estero

Età < 16 settimane	Età >16 settimane	Rabbia (Triennale)
<b>1° dose</b> età di <b>8 settimane</b>	<b>1° dose</b> > 4 mesi (16 settimane)	<b>1° dose</b> <b>&gt; 12 settimane</b> (Non somministrare <12 settimane (3 mesi))
<b>2° dose</b> <b>12 settimane</b> (intervallo di 3-4 settimane dalla prima dose)	<b>2° dose</b> dopo 3-4 settimane	<b>Richiamo</b> <b>1 anno</b> dalla prima dose
<b>3° dose</b> <b>16 settimane</b>		<b>Richiamo</b> <b>ogni 3 anni</b> dall'ultima dose somministrata
<b>Richiamo</b> <b>1 anno</b>	<b>Richiamo</b> dopo <b>1 Anno</b>	
<b>Richiamo</b> <b>ogni 3 anni</b>	<b>Richiamo</b> <b>ogni 3 anni</b>	
<b>Solo Per FELV</b> in gatti esposti a zone ad elevato rischio va richiamato <b>ogni Anno</b>		

I veterinari hanno la responsabilità di informare i propri clienti del fatto che i vaccini fanno parte di un programma di benessere complessivo dei loro animali e di fornire loro tutte le informazioni necessarie affinché possano decidere conoscendo i vantaggi e gli svantaggi delle vaccinazioni.

Ricordiamo che l'uso dei vaccini contribuisce a proteggere i loro animali dalla comparsa della maggior parte dei segni clinici delle malattie, ma che l'immunità vaccinale non è sempre in grado di prevenire l'infezione o la totalità delle manifestazioni cliniche.

Le vaccinazioni non esulano dalla possibilità di reazioni avverse che possono essere immediate o ritardate: provocando generalmente febbre, reazioni locali secondarie, bruciori, reazioni sistemiche raramente gravi e a volte fatali come lo shock anafilattico.



Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

[www.centroveterinario-santalucia.it](http://www.centroveterinario-santalucia.it)

## Linee guida per la vaccinazione del cane e del gatto



**Sempre al tuo fianco**

**ORARIO CONTINUATO**

**09.00 – 19.00**

**TUTTI I GIORNI DOMENICA E FESTIVI COMPRESI**

**Per Appuntamenti : 0541347869**

Le vaccinazioni giocano un ruolo chiave nel controllo delle malattie infettive virali sia canine che feline, in quanto parte integrante del programma di prevenzione generale della salute sia di animali adulti che dei cuccioli. Nelle prime settimane di vita, nei cuccioli che vengono allattati sin dai primi giorni, con il colostro e poi con il latte materno, si instaura una protezione immunitaria, grazie agli anticorpi che gli passa la mamma. Questi anticorpi, vanno però esaurendosi al secondo mese di vita, ed è per questo che raccomandiamo di far vaccinare tutti i cuccioli di cane e gatto, secondo un piano vaccinale ben programmato che non vada ad interferire con l'immunità materna.

La visita clinica che viene eseguita su ogni animale prima della vaccinazione è fondamentale per valutare lo stato di salute generale non solo del cucciolo ma anche di ogni cane o gatto adulto portato per il richiamo vaccinale.

Recenti studi clinici hanno dimostrato che, nell'animale adulto correttamente vaccinato, nei primi due anni di vita, la protezione nei confronti delle malattie infettive sviluppate dai vaccini è efficace per almeno tre anni; quindi, non è più necessario vaccinare tutti gli anni. Un'importante associazione di medici veterinaria americana (dell'American Animal Hospital Association,) ha così delineato delle linee guida per le vaccinazioni, proponendo il seguente protocollo vaccinale (vedi tabella). Nelle stesse linee guida, viene rimarcata l'importanza di effettuare almeno una volta all'anno una visita clinica generale, essenziale per poter evidenziare problematiche che potrebbero non essere chiaramente riconoscibili anche dai proprietari più attenti.

#### Piano vaccinale nel cane

Il programma vaccinale del cane comprende i vaccini contro:

- **PARVOVIRUS CANINO**
- **CIMURRO CANINO**
- **EPATITE INFETTIVA CANINA**
- **LEPTOSPIROSI**

- **PARAINFLUENZA CANINA e BORDETELLA BRONCHISEPTICA**
- **RABBIA:** E' obbligatoria se si porta il proprio cane all'estero e nelle zone in cui è presente la malattia.

<b>Età &lt; 16 settimane</b>	<b>Età &gt;16 settimane</b>	<b>Rabbia (Triennale)</b>
<b>1° dose</b> età di <b>6 – 8 settimane</b> (non somministrare prima delle 6 settimane)	<b>1° dose</b> > 4 mesi (16 settimane)	<b>1° dose</b> <b>&gt; 12 settimane</b> (Non somministrare <12 settimane (3 mesi))
<b>2° dose</b> <b>9-12 settimane</b> (intervallo di 3-4 settimane dalla prima dose)	<b>2° dose</b> dopo 3-4 settimane	<b>Richiamo</b> <b>1 anno</b> dalla prima dose
<b>3° dose</b> <b>12 – 16 settimane</b>		<b>Richiamo</b> <b>ogni 3 anni</b> dall'ultima dose somministrata
<b>Richiamo</b> <b>1 anno</b>	<b>Richiamo</b> dopo <b>1 Anno</b>	
<b>Richiamo</b> <b>ogni 3 anni</b>	<b>Richiamo</b> <b>ogni 3 anni</b>	
<b>Solo Per LEPTO</b> in cani esposti a zone ad elevato rischio va richiamato <b>ogni Anno</b>		